

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК

Стандартная методика втирания EN-1500

Общая продолжительность процедуры 30 секунд



1 Ладонь к ладони, включая запястья



2 Правая ладонь на левую тыльную сторону кисти и наоборот



3 Ладонь к ладони с перекрещенными пальцами



4 Пальцы в «замок», тыльной стороной пальцев растирать ладонь другой руки



5 Кругообразное растирание левого большого пальца в закрытой ладони правой руки и наоборот



6 Кругообразное втирание сомкнутых кончиков пальцев правой руки на левой ладони и наоборот

COVID-19

Обработка рук медицинского персонала кожным антисептиком

Наносить не менее 3 мл (1 доза) средства и втирать в кожу до высыхания, но не менее 30 секунд.

Кратность обработки: при входе в МО, перед приемом пищи, посещения туалета, перед надеванием и после снятия СИЗ.

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19). Версия 5 (08.04.2020)

7.4. Мероприятия по недопущению распространения COVID-19 в медицинской организации.

При выявлении больного:

Медицинский работник должен использовать СИЗ (шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор класса защиты FFP2 или FFP3), **предварительно обработав руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами.**

После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, выявивший пациента, снимает СИЗ, помещает их в бачок с дезинфицирующим раствором, обрабатывает дезинфицирующим раствором обувь и руки, полностью переодевается в запасной комплект одежды. **Открытые части тела обрабатываются кожным антисептиком.** Рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают 2 % раствор борной кислоты.